

MENSAJES FINALES

El uso del tadalafilo diario en el tratamiento de la DE:

1. Consistiría en la “4.ª onda” de un abordaje farmacológico.
2. Su aceptación es mayor entre hombres y mujeres.
3. Mayor adherencia cuando el profesional usa la tecnología de comunicación interpersonal.
4. Gran aliado del terapeuta sexual.

¿Paradigma de Evolución o Paradigma de Cambio?



Gerson Lopes: miembro consultivo del Advisory Board: Janssen-Cilag, Lilly; Disertante: Lilly, GSK, Janssen-Cilag, Bhoeringer. Brasil.

TADALAFILO USO DIARIO: ¿CAMBIO DE PARADIGMA EN EL TRATAMIENTO DE LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL?

FRANCISCO BARRIOS

ADHERENCIA TERAPÉUTICA

“Los medicamentos no funcionan en aquellos pacientes que no los toman”

C. Everett Koop

La adherencia del paciente inicia con la aceptación del tratamiento y debe prolongarse en su cumplimiento.

La aceptación es un acto momentáneo, el cumplimiento es un acto que se reedita a lo largo del tiempo con cada toma del medicamento.

FALLA EN LA ADHERENCIA TERAPÉUTICA

Más frecuente en los tratamientos crónicos.

El médico debe estar alerta a esta circunstancia y debe explicar claramente al paciente cuáles pueden ser las consecuencias de esta falta de adherencia.

ASPECTOS PRÁCTICOS DE LAS INTERVENCIONES PARA MEJORAR LA ADHERENCIA


Reducir la complejidad del tratamiento:

- reducción de la frecuencia de dosis;
- reducción del número de fármacos;
- adaptación de la pauta a los hábitos de vida;
- organizadores de medicación.

EXITO POR DOSIS Y A LO LARGO DEL TIEMPO


Cinco estudios doble ciego, controlados con placebo con 12 semanas de duración aleatorizaron placebo/tadalafilo 10 y tadalafilo 20 mg a dosis fijas (887 hombres).

La proporción de hombres obteniendo éxito se incrementó con la dosificación continua llegando a una meseta entre la dosis 4 y 8.




Integrated analysis examining first-dose success, success by dose, and maintenance of success among men taking tadalafil for erectile dysfunction

Claude C. Schulman, Wei Shen, Diane R. Stothard, Henry Schmitt



Coitos exitosos por dosis.



Mayor satisfacción con el uso continuo de Tadalafilo.

Schulman CC *et al.* Urology. 2004;64(4):783-8.

PROBABILI- DAD PARA MANTE- NERSE EN TRATAMIENTO

Altas tasas de tratamientos discontinuados en disfunción eréctil.

En el estudio MALES (Men's Attitudes to Life Events and Sexuality), 58% de los hombres buscaron tratamiento activamente pero sólo 16% continuaron la terapia oral.

Esto sugiere que la restauración de la función eréctil NO es el único factor para los hombres y sus compañeras para recuperar una vida sexual mutuamente satisfactoria.

CONCLU- SIONES

Los IPD5 son la terapia de primera línea para la mayoría de los hombres con disfunción eréctil.

Existen implicaciones clínicas respecto a la primera elección de IPD5 para pacientes nuevos al tratamiento.

Iniciar terapia con tadalafilo en estos pacientes incrementa la posibilidad de continuar con el tratamiento que es un factor importante para pacientes cuyo seguimiento no es fácil.

CONCLUSIÓN - TADALAFILO 5 MG TOMA DIARIA

Paciente hipertenso: No se siente enfermo.

OBJETIVO

Paciente con disfunción eréctil: que no se sienta enfermo

Se OPTIMIZA un tratamiento que ya era bueno por algo MEJOR....

Francisco Barrios: *Urólogo del Hospital Angeles Lomas, México, DF; Consultor: Eli Lilly, Pfizer, Quantas Laser Technology, More Pharma; Ponente: Eli Lilly, Pfizer, More Pharma; Investigador clínico: Eli Lilly, Sanofi Aventis, Abbott.*

