


MENSAGENS FINAIS

O uso diário da tadalafila na disfunção erétil:

1. Seria a “4ª onda” de uma abordagem farmacológica.
2. Tem uma aceitação maior da parte de homens e mulheres.
3. Maior aderência quando o profissional usa de tecnologia de comunicação interpessoal.
4. Grande aliado do terapeuta sexual.

Paradigma de Evolução ou Paradigma de Mudança?



Gerson Lopes: membro consultivo do Advisory Board: Janssen-Cilag, Lilly; Conferencista: Lilly, GSK, Janssen-Cilag, Bhoeringer. Brasil.

A TADALAFILA DIÁRIA REPRESENTA UMA MUDANÇA DE PARADIGMA NO TRATAMENTO DA DISFUNÇÃO ERÉTEL?

FRANCISCO BARRIOS

ADERÊNCIA TERAPÊUTICA

“Os medicamentos não funcionam naqueles pacientes que não os tomam.”

C. Everett Koop

A aderência do paciente inicia com a aceitação do tratamento e deve prolongar-se em seu cumprimento.

A aceitação é um ato momentâneo, o cumprimento é um ato que se reedita no decorrer do tempo com cada tomada do medicamento.

FALHA NA ADERÊNCIA TERAPÊUTICA

Mais frequente nos tratamentos crônicos.

O médico deve ficar alerta para essa situação e deve explicar claramente ao paciente quais podem ser as consequências dessa falta de aderência.

ASPECTOS PRÁTICOS DAS INTERVENÇÕES PARA MELHORAR A ADERÊNCIA

Reduzir a complexidade do tratamento:

- redução da frequência da dose;
- redução do número de fármacos;
- adaptação do esquema de tratamento aos hábitos de vida;
- organizadores de medicamentos.


Integrated analysis examining first-dose success, success by dose, and maintenance of success among men taking tadalafil for erectile dysfunction

Claude C. Schulman, Wei Shen, Diane R. Stothard, Henry Schmitt


Êxito por dose e no decorrer do tempo

Cinco estudos, duplo cego, controlados com placebo, pelo período de 12 semanas, administração aleatória de placebo/tadalafila 10 mg e tadalafila 20 mg com doses fixas (887 homens).

A proporção de homens que obtiveram êxito aumentou com a dose contínua, e chegou a um platô entre a dose 4 e 8.



Coitos bem sucedidos por dose.



Maior satisfação com o uso contínuo da tadalafila.

Schulman CC *et al.* Urology. 2004;64(4):783-8.

PROBABILIDADE PARA MANTER-SE NO TRATAMENTO

Taxas altas de descontinuidade do tratamento em disfunção erétil.

No estudo MALES (Men's Attitudes to Life Events and Sexuality), 58% dos homens buscaram ativamente o tratamento, porém apenas 16% continuaram a terapia oral.

Isso sugere que a restauração da função erétil NÃO é o único fator para os homens e suas parcerias para recuperar uma vida sexual mutuamente satisfatória.

CONCLUSÕES

Os inibidores da PDE-5 são a terapia de primeira linha para a maioria dos homens com disfunção erétil.

Existem implicações clínicas com relação à primeira escolha dos inibidores da PDE-5 para pacientes novos ao tratamento.

Nesses pacientes, iniciar a terapia com tadalafila aumenta a possibilidade de continuidade com o tratamento, que é um fator importante para pacientes cujo seguimento não seja fácil.

CONCLUSÃO – TADALAFILA 5 MG AO DIA

Paciente hipertenso: não se sente enfermo.

FINALIDADE

Paciente com disfunção erétil: que não se sinta enfermo

OTIMIZA-se um tratamento que já era bom por algo MELHOR...

Francisco Barrios: Urologista do Hospital Angeles Lomas, México, DF; Consultor: Eli Lilly, Pfizer, Quantas Laser Technology, More Pharma; Conferencista: Eli Lilly, Pfizer, More Pharma; Investigador clínico: Eli Lilly, Sanofi Aventis, Abbott.

