

SLAMS 2013



XII Congress of the Latin American Society for Sexual Medicine

August 28th - 31st Fiesta Americana Condesa Hotel - Cancun, Mexico

Take Home Messages

Sábado 31 de agosto de 2013

0930 - 1100

SLAMS 2013



XII Congress of the Latin American Society for Sexual Medicine

August 28th - 31st

Fiesta Americana Condesa Hotel - Cancun, Mexico

DISFUNCIÓN SEXUAL Y

COMORBILIDADES

DRA. ARAÍ VELA MOSQUERA

UROLOGA

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EUGENIO ESPEJO

QUITO ECUADOR



DIABETES

DE BONIS

- 49.4% refractarios a iFDE5
- TRIMIX (fentolamina, PGE1, papaverina) 85%.
- Abandono 30% (costo/dolor);
- Eyaculación retrógrada 12.5%, dolor 2.5%, priapismo 1.3%

STUI/PATOLOGÍA PROSTÁTICA

CASABE

- *Coexisten mismo grupo etario*
- *Fisiopatología común STUI/HPB y DE.:*
 - Hipoxia e incremento factor de crecimiento nervioso (vejiga hipertrófica secundaria)*
 - Incremento de señales neurológicas aferentes*
- *Alfa bloq y i5AR: disfunción eréctil y eyaculatoria*
- *iPDE5 mejoran 4-6 puntos en el IPSS*
- *iPDE5 mejoran flujometría = alfa bloqueadores en obstrucción leve*

HIPERCOLESTEROLEMIA/OBESIDA

D/

ATEROESCLEROSIS

· FRAGA SILVA

INCREMENTO ECA2: aumenta ON y disminuye fibrosis; baja Colest

INHIBICIÓN DE ARGINASA: normaliza estrés oxidativo y ON

· CASTILLEJOS MOLINA.

TAC ABD PELV: correlación coronaria y pudenda

SCC: factor predictor DE

LAYUS

OBESIDAD: resistencia insulina y leptina; hipogonadismo, lesión endotelial (DE), bajo recuento y calidad espermática.

CIRUGIA BARIATRICA: 6 m. glucosa/ insulina; mejora TT y TL; no variación GH; función sexual (IIEF)

CANCER

· CASTILLEJOS MOLINA

- 40% D.E. Previa; erección dolor 14% ; pérdida del deseo sexual
- 25% recuperación espontánea: edad, técnica, adyuvantes, depresión
- Lesión nerviosa: apoptosis neuronal, disminución ON, fibrosis
- 80% bajo riesgo, recuperan erección
- Crioterapia, hifu, terapia fotodinámica vascular tookad (oclusión vascular)
- Crioterapia preserva 89% erección; hifu D.E. 13-30%

· BECHARA

- Tadalafilo 5mg diario solo o combinado, evaluar 6-12 meses
- 58% recuperación en 3 años; 19% no recuperación

CANCER

· MAC MAÑOM

- *Lesión neurógena, venógena, arteriόgena, psicόgena*
- *30-35% no responden a iPDE5; TRIMIX 70%*
- *Sildenafil 50mg, evaluar 4 tomas*
- *Tratamiento intermitente preserva función sexual*

· AFIF ABDO

- *30-60% prostatectomizados D.E.*
- *Dispareunia/hemospermia: quimio/radioterapia, sonda prolongada, biopsia, cirugía endoscópica*

ERC/TRASPLANTE

MAGAÑA RODRÍGUEZ

- *Estudio prospectivo no randomizado; función sexual evaluada 3 meses antes (IIEF) y después*
- *Mejoría de 75% función eréctil*
- *No se logra demostrar relación directa entre tiempo de diálisis y DS.*
- *Se recomienda evaluar mínimo entre 6-12 meses antes de trasplante*

DEPRESIÓN Y ESTRÉS

• APONTE

- *Testosterona: receptores neuronas dopaminérgicas*
- *Finasteride disminuye síntesis dopamina. No acción serotonina*
- *Hipogonadismo: desánimo, deseo sexual hipoactivo (pesquisa)*

• DELGADO

- *DMS 2013: Alteración ánimo, predomina tristeza, >2 sem, días*
- *3ª. CAUSA INCAPACIDAD (1ª. 2030) alto riesgo comorbilidades*
- *31% deseo hipoactivo; 35% d. E.; 47% retraso erección*

• SEGNINI

- *Estrés crónico: distress, ansiedad, angustia*
- *Incremento crónico adrenalina: D.E. Y EP*
- *Incremento cortisol: disminución hormonas sexuales; D.D.*

HÁBITOS

· URIBE, ALIMENTACIÓN

- Más obeso, más hipogonádico; dieta potente cura
- 3 décadas perdidas de enseñanza: azúcares y cereales, tóxicos

· BERTERO, EJERCICIO

- Sedentarismo incrementa lesión endotelial; 30% más D.E
- 20% normalizan F.S., 200-300 min semanales ejercicio

· MAZZA, DROGAS, TABACO Y ALCOHOL

- Elevación dopamina (coca, heroína, morfina, marihuana)
- Alcohol y cocaína a bajas dosis, facilitadores
- Testosterona; marihuana disminuye, tabaco incrementa

